

Bryophytes exotiques :
Bryophytes des Nouvelles-Hébrides
(expédition de la Royal Society)

par Pierre TIXIER *

Abstract. — In this paper the author gives a list of 74 species (47 Mosses, 27 Liverworts) collected by the Royal Society in the New Hebrides archipelago. Two species are new for Science : *Tayloria braithwaitiana* and *Chiloscyphus santoensis*.

Nous donnons, dans cette troisième série¹, les listes des espèces récoltées par l'expédition de la Royal Society aux Nouvelles-Hébrides en 1971. Les échantillons nous ont aimablement été communiqués par le Pr A. F. BRAITHWAITE de l'Université de Nottingham, Grande Bretagne. Nous l'en remercions bien sincèrement.

Les listes comprennent 47 Mousses et 27 Hépatiques. Deux espèces (*Tayloria braithwaitiana* et *Chiloscyphus santoensis*) sont nouvelles pour la Science, 22 Mousses et 19 Hépatiques nouvelles pour l'archipel.

Sur le plan biogéographique, nous remarquerons que certaines espèces représentent un « pont » entre les flores tropicales et les flores antarctiques, et que, pour d'autres, les Hébrides représentent la limite méridionale de la distribution.

Dans le premier groupe nous placerons *Tayloria braithwaitiana*, de la section *Eremodon* qui annonce les *Tayloria* néo-zélandais, et *Breutelia arundinifolia* connu de Tasmanie et de Nouvelle-Guinée. Dans le second groupe nous citerons *Mnium succulentum* et *Jubula hutchinsiae*.

Enfin, nous avons trouvé quelques espèces réputées endémiques de Nouvelle-Calédonie.

Dans les listes suivantes, nous indiquons les espèces nouvelles pour la région par un astérisque.

L'abréviation RSNH représente « Royal Society New Hebrides ».

MOUSSES

***Fissidens sylvaticus** Griff.

Espiritu Santo, crête nord-ouest et sommet du mont Tabewasama, épiphyte dans la forêt de crête, 1 700-1 800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2482).

* Laboratoire de Cryptogamie, 12, rue de Buffon, 75005 Paris.

1. Première et deuxième séries in : Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris, 3^e sér., nos 48 (1972) et 190 (1973).

Afrique, Ceylan, Andamans, sud de la Chine, Indochine, Malésia, Nouvelle-Guinée, archipel Bismarck, d'Entrecasteaux, Nouvelle-Calédonie (sub. nom. *F. insularis* Thériot).

***Dicranoloma blumei** Nees

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, épiphyte dans la forêt à *Metrosideros*, 1 800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2484).

Himalaya, Ceylan, Sumatra, Java, Sulawesi, Indochine, Malaisie, Bornéo, Philippines, îles d'Entrecasteaux, Louisiane, Fidji, Nouvelle-Calédonie.

***Campylopus caudatus** Bosch & Lac.

Espiritu Santo, crête nord-ouest et sommet du mont Tabewasama, épiphyte dans la forêt de crête, 1 700-1 800 m, 2-IX-1971 (n° 2483).

Nilghiri, Java, Bornéo, Moluques, Nouvelle-Calédonie.

Campylopus richardii Brid.

Espiritu Santo, crête nord-ouest et sommet du mont Tabewasama, au sol dans une petite clairière dans la forêt de crête, 1 650 m, 2-IX-1971 (n° 2458).

Pantropical.

***Campylopus verrucosus** Besch.

Espiritu Santo, au sol, sur un talus de la crête du sommet du mont Tabewasama, 1 650 m, 2-IX-1971 (n° 2457).

Nouvelle-Calédonie.

Leucobryum bowringii Mitt.

Espiritu Santo, crête du nord-ouest et sommet du mont Tabewasama, épiphyte en forêt basse de crête à *Metrosideros*, 1 800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2452).

De l'Inde à la Nouvelle-Calédonie.

Leucobryum candidum Hook. f. & Wils.

Vaté, colline sans nom (nord-ouest de Twig Point), environ 2 km, est-sud-est du camp Navabut de l'Undine Bay, 488 m, 5-VII-1971 (RSNH n° 2057).

Du Népal à la Nouvelle-Zélande.

Arthrocormus schimperii Doz. & Molk.

Erromango, 2 km au nord du pont sur la Nouanko, le long du chemin de bûcheronnage secondaire, en forêt d'*Agathis* et de *Calophyllum*, mousses de crête, 200 m, 4-VIII-1971 (RSNH n° 2224).

De Ceylan à Tahiti.

Syrrhopodon tristichus Nees

Tanna, crête ouest du mont Toukomeru, 900 m, 28-VII-1971 (RSNH n° 2216).

De Ceylan aux Nouvelles-Hébrides.

***Thyridium cuspidatum** (Besch.) Fleisch.

Erromango, voisinage du pont sur la Nouanko, épiphytes de cime sur arbres récemment abattus, 200 m, 8-VIII-1971 (RSNH n° 2298) ; Espiritu Santo, crête nord-ouest et sommet du mont Tabewasama, épiphyte sur *Metrosideros*, 1 800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2448).

Asie du Sud-Est.

***Hydrogonium consanguineum** (Thw. & Mitt.) Hilp.

Espiritu Santo, vallée de l'Apouna, sur rochers humides dans la rivière, 270 m, 11-XI-1971 (RSNH n° 2515).

Ceylan, Malaisie, Philippines, Indochine, Woodlark Island, Formose, Nouvelle-Guinée.

***Hydrogonium inflexum** (Duby) Chen

Espiritu Santo, même station (RSNH n° 2514).

Java.

***Mnium esculentum** Mitt.

Espiritu Santo, chemin de bûcheronnage après le pont sur la Nouanko, en forêt dense, épiphyte de base de tronc, 200 m, 4-VIII-1971 (RSNH n° 2446 A).

Népal, Assam, Indes, Ceylan, Malaisie, Japon, Indochine, Sumatra, Java, Bornéo, Nouvelle-Guinée.

***Tayloria braithwaitiana** nov. sp.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, au sol, à l'ombre, 1 750 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2459).

Endémique.

Rhizogonium setosum (Mitt.) Mitt.

Anotom, 4,5 km nord-nord-est de Anelgauhaut, en forêt dense, rupicole, 20-VIII-1971 (RSNH n° 2218) ; Erromango, forêt à *Agathis* et *Calophyllum*, sur troncs et rochers sur le chemin de bûcheronnage à partir du pont de la Nouanko, 4-VIII-1971 (RSNH n° 2246) ; Espiritu Santo, vallée de l'Apouna, sur rochers en forêt, 11-IX-1971 (RSNH n° 2508).

Nouvelle-Guinée, Nouvelles-Hébrides, Tahiti, Samoa.

Hypnodendron vitiense Mitt. spp. **vitiense**

Espiritu Santo, crête et bord du sommet principal, au-dessus de Nokowala, menant au mont Tabewasama, forêt primaire de moyenne altitude, 1 325-1 400 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2456).

Ryu Kyu, Vietnam, Formose, Philippines, Moluques, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Mariannes, Australie, Nouvelles-Hébrides : Espiritu Santo, Erromango, Anotom.

***Philonotis turneriana** (Schw.) Mitt.

Espiritu Santo, vallée de l'Apouna, forêt galerie de basse région, sur rebords d'érosion du lit de la rivière, 270 m, 11-IX-1971 (RSNH n° 2504).

Java, Népal, Sikkim, Khasia, Hawaï.

***Breutelia arundinifolia** (Duby) Fleisch.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, 1 800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2455). Indes, Sumatra, Java, Lombok, Bornéo, Japon, Formose, Luzon, Mindanao, Nouvelle-Guinée, Hawaï, Tasmanie.

Spiridens flagellosus Schimp.

Vaté, 2 km est-sud-est du camp de Novabut, Undine Bay, forêt tropicale humide primaire soumise aux typhons, 488 m, 5-VII-1971 (RSNH n° 2057).

Samoa et Nouvelles-Hébrides.

***Macromitrium** cf. **micropoma** Fleisch.

Anotom, 4,5 km de Anelgauhaut, épiphytes sur arbres tombés, 20-VII-1971 (RSNH n° 2091).

Java.

Macromitrium salakanum C. Muell.

Anotom, 5 km nord-nord-est de Anelgauhaut, épiphytes de cime sur arbres au sol, 20-VII-1971 (RSNH n° 2091) ; Erromango, sur chemin de bûcheronnage au-delà du pont sur la rivière Nouanko, forêt de basse région à *Agathis* et *Calophyllum*, 8-VIII-1971 (RSNH n° 2299).

Java, Sulawesi, Philippines, Nouvelle-Guinée, Nouvelles-Hébrides.

***Macromitrium semi pellucidum** Doz. & Molk.

Vaté, nord-ouest du camp de Novabut, Undine Bay, mousse sur tronc horizontal dans un site autrefois cultivé, 275 m, 6-VII-1971 (RSNH n° 2064).

De Ceylan à la Louisiade.

Racopilum spectabile Reinw. & Hornsch.

Erromango, chemin de bûcheronnage en forêt de basse région à *Agathis* et *Calophyllum*, après le pont sur la Nouanko, épiphyte sur le bas de petits troncs, 200 m, 4-VIII-1971 (RSNH n° 2247).

De l'Indochine aux îles du Pacifique.

***Euptychium austrocaledonicum** (Besch.) Broth.

Anotom, sud, 4,5 km de Anelgauhaut, épiphytes de cime sur arbres au sol, 20-VII-1971 (RSNH n° 2091).

Nouvelle-Calédonie.

Euptychium gunnii Broth. & Watts

Erromango, chemin de bûcheronnage en forêt de basse région humide à *Agathis* et *Calophyllum*, à 11 km du pont sur la Nouanko, épiphytes sur arbres abattus, 8-VIII-1971 (RSNH n° 2292).

Endémique.

***Trachyloma tahitense** Besch.

Espiritu Santo, crête et flanc sud, au-dessus de Nokowala, menant au sommet du mont Tabewasama, 25 km sud-sud-ouest du village de Malao, Big Bay, 1 345-1 400 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2470).

Java, Lombok, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Hawaï.

Calypothecium urvilleanum (C. Muell.) Broth.

Espiritu Santo, vallée de l'Apouna, forêt de basse région, 270 m, 11-IX-1971 (RSNH n° 2507).

De l'Inde du Sud à Tahiti et aux Samoa.

Symphysodon gunnii Broth. & Watts

Erromango, chemin de bûcheronnage en forêt humide de basse région à *Agathis* et *Calophyllum*, après le pont de la Nouanko, à 17 km ouest-sud-ouest de Ipota, 8-VIII-1971 (RSNH n° 2292).

Forme robuste, endémique connu seulement d'Anotom.

Floribundaria floribunda (Doz. & Molk.) Fleisch.

Espiritu Santo, vallée de l'Apouna, terrestre en forêt galerie, 270 m, 11-XI-1971 (RSNH n° 2525).

Afrique, Asie, Océanie tropicales.

Himantocladium loriforme (Lac.) Fleisch.

Espiritu Santo, vallée de l'Apouna, terrestre en forêt galerie, 270 m, 11-IX-1971 (RSNH n° 2525).

Japon, Formose, Malésie, Australie, îles Palaos, Carolines, Nouvelles-Hébrides, Fidji, Samoa.

***Himantocladium plumula** (Nees) Fleisch.

Espiritu Santo, vallée de l'Apouna, forêt de basse région, épiphyte sur petits troncs, 250 m, 11-IX-1971 (RSNH n° 2509).

Indochine du Sud, Malésie, Nouvelle-Calédonie.

Cyathophorella tahitense Besch.

Espiritu Santo, crête du Nord-Ouest, au-dessus de Nokowala, conduisant au sommet

du mont Tabewasama, à 25 km sud-sud-ouest du village de Malao (Big Bay), forêt primaire d'altitude, 1 325-1 400 m, 21-IX-1971 (RSNH n° 2247).
Tahiti, connu d'Anotom.

Thuidium cymbifolium (Doz. & Molk.) Bosch & Lac.

Vaté, Undine Bay, en forêt tropicale secondaire, poussant sur les rochers, 275 m, 6-VII-1971 (RSNH n° 2065) ; Espiritu Santo, crête du Nord-Ouest et sommet du mont Tabewasama, terrestre en forêt ombrophile de montagne, 1 600 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2462).

De l'Himalaya aux îles du Pacifique.

Thuidium glaucinoides Broth.

Espiritu Santo, vallée de l'Apouna, terrestre en forêt galerie, 270 m, 11-XI-1971 (RSNH n°s 2508, 2525).

De l'Indochine aux îles du Pacifique.

Thuidium meyenianum (Hamp.) Bosch & Lac.

Mallicolo, côte ouest, rochers dans un ruisseau, 5 m, 4-X-1971 (RSNH n° 2567).

De l'Himalaya aux îles du Pacifique.

* **Rhynchostegium javanicum** Bel. var. *majus* Besch.

Mallicolo, côte ouest, Tisvel, rochers dans un ruisseau, 5 m, 4-X-1971 (RSNH n° 2565) ; Espiritu Santo, crête du nord-ouest et sommet du mont Tabewasama, épiphyte dans la forêt de crête, 1 700-1 800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2476).

Nouvelle-Calédonie.

* **Sematophyllum microcladiellum** Fleisch.

Erromango, chemin de bûcheronnage à 1 km de Ipota, après le pont sur la Nouanko, forêt ombrophile de basse région à *Agathis* et *Calophyllum*, épiphytes sur arbres récemment abattus, 8-VIII-1971 (RSNH n° 2295).

Malésie, Nouvelle-Guinée, Carolines.

* **Acroporium hamulatum** (Doz. & Molk.) Fleisch.

Espiritu Santo, crête du mont Tabewasama, en forêt, 2-IX-1971 (RSNH n° 2454).

Indochine, Malaisie, Java, Luzon.

Acroporium turgidum (Doz. & Molk.) Fleisch.

Erromango, sud-ouest Ipota, route de bûcheronnage à 17 km du pont sur la Nouanko, forêt ombrophile de basse région à *Agathis* et *Calophyllum*, 8-VIII-1971 (RSNH n° 2295) ; Espiritu Santo, crête du Nord-Ouest et sommet du mont Tabewasama, épiphyte dans la forêt de crête, 1 700-1 800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2485).

Ceylan (?), Indochine, Malésia, Nouvelle-Guinée, îles d'Entrecasteaux, Louisiade, Samoa, Nouvelles-Hébrides (Tanna et Anotom).

***Glossadelphus obscurum** Broth. & Par.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, épiphyte dans la forêt à *Metrosideros*, 1 800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2449).
Nouvelle-Calédonie.

Ectropothecium aubertii Thér.

Erromango, chemin de bûcheronnage après le pont sur la Nouanko, forêt ombrophile de basse région à *Agathis* et *Calophyllum*, mousse commune sur rochers et arbres tombés, 200 m, 4-VIII-1971 (RSNH n° 2645).
Endémique connu de Vanua Lava et de Tanna.

***Ectropothecium ichnotocladum** (C. Muell.) Jaeg.

Espiritu Santo, crête du nord-ouest et sommet du mont Tabewasama, forêt basse de montagne à *Metrosideros*, épiphyte, 1 750 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2465).
Vietnam, Malésia, Nouvelle-Guinée, îles d'Entrecasteaux.

Ectropothecium tannaense Thér.

Espiritu Santo, vallée de l'Apouna, terrestre sur les rochers, 200 m, 13-IX-1971 (RSNH n° 2518).
Endémique de Tanna.

***Isopterygium albescens** (Hook.) Jaeg.

Vaté, Novabat près de Undine Bay, forêt tropicale secondaire, épiphyte sur petits troncs, 275 m, 6-VII-1971 (RSNH n° 2215).
Asie du Sud-Est jusqu'aux Hawaï et en Nouvelle-Calédonie.

Vesicularia aperta (Sull.) Thér.

Mallicolo, est du village de Tisvel, 5 m, 5-X-1971 (RSNH n°s 2572, 2573).
Hawaï, Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides (Erronan).

***Vesicularia subinflectens** (C. Muell.) Par.

Espiritu Santo, vallée de l'Apouna, rocher dans une rivière, 200 m, 15-IX-1971 (RSNH n° 2517).
Samoa.

Pogonatum circinatum Besch.

Espiritu Santo, crête du nord-ouest conduisant au sommet du mont Tabewasama, au-des-

sus du Nokowala, forêt primaire de moyenne altitude, 1 325-1 400 m, 21-IX-1971 (RSNH n° 2486).

Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides (Anotom, Espiritu Santo, même station).

HÉPATIQUES

***Bazzania tridens** (Reinw., Blume, Nees) Trev.

Erromango, chemin de bûcheronnage en forêt ombrophile de basse région à *Agathis* et *Calophyllum*, à 17 km du pont sur la Nouanko, épiphytes de cime sur arbres récemment abattus, 8-VIII-1971 (RSNH n° 2301).

De l'Inde du Sud à Sulawesi et au Japon.

***Bazzania fragile** (St.) P. Tx. (= **Mastigobryum fragile** St., VI, 1922 : 463)

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, épiphyte sur *Metrosideros*, 1 750 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2464).

Philippines, Hawaï, espèce variable d'après les dessins de STEPHANI.

Bazzania spiralis (Reinw., Blume, Nees) Meyer

Erromango, chemin de bûcheronnage en forêt ombrophile de basse région à *Agathis* et *Calophyllum*, à 17 km du pont sur la Nouanko, épiphyte de cime sur arbres récemment abattus, 8-VIII-1971 (RSNH n° 2303).

Asie du Sud-Est, déjà connu de Anotom.

***Bazzania sumbavensis** (Goot. ex St.) St.

Vaté, camp près de Novabut, Undine Bay, épiphyte sur petit tronc, 275 m, 6-VIII-1971 (RSNH n° 2215).

De l'Assam à Sumbawa et Tahiti.

***Bazzania vittata** (Gott.) Trev.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, épiphyte sur *Metrosideros*, 1 750 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2464).

Asie et Océanie tropicales jusqu'à Tahiti.

***Acromastigum filum** (St.) Ev.

Tanna, mont Toukosmereu, épiphyte, 900 m, 28-VIII-1971 (RSNH n° 2214 A).
Nouvelle-Calédonie.

Lepidozia trichodes (Reinw., Blume, Nees) Nees

Vaté, nord-ouest du camp de Novabut, Undine Bay, forêt tropicale secondaire, épiphyte sur petit tronc d'arbre, 275 m, 6-VII-1971 (RSNH n° 2215).

Asie et Océanie.

* **Schistochila blumei** (Nees) Trev.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, épiphyte sur *Metrosideros*, 1 800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2468).

Java, Sumatra, Philippines, Moluques.

* **Schistochila rubristipula** St.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, épiphyte sur *Metrosideros*, 1 800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2453).

Sumatra.

Chandonanthus hirtellus (Web.) Mitt.

Erromango, chemin de bûcheronnage en forêt ombrophile de basse région à *Agathis* et *Calophyllum*, 17 km après le pont sur la Nouanko, ouest-sud-ouest de Ipota, épiphytes de cimes sur arbres abattus, 8-VIII-1971 (RSNH n° 2294) ; Espiritu Santo, crête nord-ouest et sommet du mont Tabewasama en forêt à *Metrosideros*, en coussin au sol en forêt, 1 650 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2450).

Pantropical.

* **Chiloscyphus santoensis** nov. sp.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama sur *Metrosideros*, 1 800 m, 2-IX-1971 (RSNH n°s 2469, 2477).

Endémique.

* **Herberta** cf. **herpocladoides** Scott & Miller

Espiritu Santo, crête et versant ouest du relief principal menant au sommet du mont Tabewasama, au-dessus de Nokowula, à 25 km de Malao, Big Bay, 1 325-1 400 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2481).

Hawaï.

* **Herberta tutuilana** Pears.

Erromango, chemin de bûcheronnage, en forêt ombrophile de basse région à *Agathis* et *Calophyllum*, à 17 km du pont sur la Nouanko, ouest-sud-ouest d'Ipota ; épiphytes de cime sur arbres abattus, 8-VIII-1971 (RSNH n° 2301).

Samoa.

* **Mastigophora diclados** Endl.

Vaté, 2 km est-sud-est du camp de Novabut, Ondine Bay, épiphyte de forêt de crête, 488 m, 5-VII-1971 (RSNH n° 2060) ; Erromango, chemin de bûcheronnage, en forêt ombrophile de basse région, à 17 km du pont sur la Nouanko, ouest-sud-ouest d'Ipota, épiphytes de cime sur arbres abattus, 8-VIII-1971 (RSNH n° 2304) ; Espiritu Santo,

sur crête et flanc ouest du relief principal du mont Tabewasama, 25 km de Malao, épiphyte commun et au sol, 1 650 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2451).

Pantropical.

Trichocolea pluma Mont.

Vaté, camp de Novabut, Undine Bay, épiphyte en forêt de crête, 488 m, 5-VII-1971 (RSNH n° 2062) ; Espiritu Santo, sur crête et flanc ouest du principal relief menant au sommet du mont Tabewasama, au-dessus de Nokowala et à 25 km du village de Malao (Big Bay), terrestre et à l'ombre, 1 750 m, 2-IX-1971 (RSNH n°s 2471, 2472) ; Tanna, mont Toukosmereu, terrestre à l'ombre, 900 m, 28-VII-1971 (RSNH n° 2217).

Pantropical.

* **Radula miqueliana** Tayl.

Vaté, camp de Novabut, Undine Bay, épiphyte commun sur les parties basses des petits arbres de la forêt de crête à 488 m, 5-VII-1971 (RSNH n° 2061).

De Java aux îles du Pacifique.

* **Radula wattsiana** St.

Erromango, chemin de bûcheronnage, en forêt ombrophile de basse région à *Agathis* et *Calophyllum*, après le pont sur la Nouanko, 200 m, 4-VIII-1971 (RSNH n° 2244).
Australie, Tasmanie.

* **Archilejeunea mariana** St.

Anotom, 4,5 km nord-nord-est de Anelgauhaut, épiphytes de cime sur arbres abattus, 20-VII-1971 (RSNH n° 2091 C).

Asie et Océanie tropicales.

* **Archilejeunea nymanii** St.

Erromango, chemin de bûcheronnage, en forêt ombrophile de basse région, 17 km après le pont sur la Nouanko, ouest-sud-ouest d'Ipota, épiphytes de cimes sur arbres abattus, 8-VIII-1971 (RSNH n° 2300).

Nouvelle-Guinée.

* **Ceratolejeunea renistipula** St.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, épiphyte en forêt à *Metrosideros*, 1 800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2449).

Tahiti, Nordfolk, Samoa, Andamans, Luzon, Banca.

* **Taxilejeunea parvisaccata** (St.) Eifrig

Espiritu Santo, sur la crête et le relief principal menant au sommet du mont Tabewasama,

au-dessus de Nokowala, à 25 km sud-sud-ouest du village de Malao, Big Bay, à l'ombre sur la base des troncs, 1 325-1 400 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2446 A).

Asie et Océanie tropicales.

***Taxilejeunea sordida** (Nees) Eifrig

Erromango, chemin de bûcheronnage, en forêt ombrophile de basse région, 17 km après le pont sur la Nouanko, ouest-sud-ouest d'Ipota, épiphytes de cime sur arbres récemment abattus, 8-VIII-1971 (RSNH n° 2300).

Asie et Océanie tropicales.

Thysananthus fruticosus (Lind. & Gott.) Schiffn.

Vaté, près du camp de Novabut, Undine Bay, épiphyte commun à la base des troncs dans la forêt de crête, 488 m, 5-VII-1971 (RSNH n° 2061); Espiritu Santo, vallée de l'Apouna, épiphyte commun en forêt galerie, 270 m, 11-IX-1971 (n° 2056).

Asie et Océanie tropicales, connu de Vanua Lava, Aoba et Arach-Arach aux Nouvelles-Hébrides.

***Thysananthus spathulistipus** (Reinw., Blume, Nees) St.

Erromango, chemin de bûcheronnage, en forêt ombrophile de basse région, à 17 km du pont sur la Nouanko, épiphytes recueillis sur des arbres récemment abattus, 8-VIII-1971 (RSNH n°s 2300, 2302).

Afrique du sud, Madagascar, Indes, Ceylan, Malésie, Indochine.

***Jubula hutschinsiae** ssp. *javanica* (St.) Verd.

Espiritu Santo, sommet du mont Tabewasama, épiphyte en forêt de crête, 1 700-1 800 m, 2-IX-1971 (RSNH n° 2480).

Du Caucase aux Hawaï et aux Samoa.

Frullania apiculata Auct.

Erromango, chemin de bûcheronnage, en forêt ombrophile de basse région à *Agathis* et *Calophyllum*, à environ 17 km du pont sur la Nouanko, épiphytes de cime récoltés sur des arbres abattus, 8-VIII-1971 (RSNH n° 2301).

De Ceylan à la Nouvelle-Guinée.

ESPÈCES NOUVELLES

Tayloria braithwaitiana nov. sp.

Planta cum caulibus rectis, longis usque ad 3-4 cm, rubrotomentosis ad basin, folia distantia interse medio intervallo, latere caulis inserta, spatulata, cum apice denticulato. Nervus plus aut minus evidens, folia 2,5-4 mm longa, 1-1,5 mm lata.




FIG. 1. — *Tayloria braithwaitiana* nov. sp.
1, feuilles ; 2, base de la feuille ; 3, marge supérieure de la feuille ; 4, coupe de la feuille ;
5, feuilles périchétiales.

Cellulis cum parietibus tenuibus, rectangularibus aut hexagonalibus. Sectio folii cum pluribus ordinibus cellularum in media parte, sine stereidis.

Planta dioica; flos femineus lateralis, folia perichaetiala fortiter denticulata. Coetera desunt.

Plantes à tiges dressées, longues jusqu'à 3-4 cm, avec un tomentum de rhizoïdes rougeâtres à la base. Feuilles largement espacées et insérées latéralement sur la tige, spatulées avec des dents vers l'apex longues de 2,5-4 mm larges de 1-1,5 mm. Nervure plus ou moins visible. Cellules à parois minces, rectangulaires à hexagonales de 100 μ de long. En section, nervure à plusieurs couches de cellules sans stéréides. Plante dioïque ; fleurs femelles sur les tiges ; feuilles périchétiales fortement denticulées. Le reste inconnu.

Espèce proche de *T. purpurascens* (Hook. f. & Wils.) Broth. de Nouvelle-Zélande (section *Eremodon*). Dédiée au Professeur A. F. BRAITHWAITE.

***Chiloscyphus santoensis* nov. sp.**

Planta robusta, caules longi usque 1-2 cm, 0,15 mm crassi, cum foliis 6 mm lata. Folia rotundata, 2,5 mm in diametro. Cellulis cum trigonibus magnis, 28-30 μ in diametro. Amphigastrium divisum, 1,5 mm altum, 1,5 mm latum. Pars inter amphigastrium foliamque denticulata.




FIG. 2. — *Chiloscyphus santoensis* nov. sp.
1, tige ; 2, dent de l'amphigastre ; 3, base de l'amphigastre ; 4, marge de la feuille.

Plante robuste avec des tiges de 2 cm de longueur, 0,15 mm d'épaisseur et 6 mm de largeur avec les feuilles. Feuilles arrondies de 2,5 mm de diamètre. Cellules des feuilles avec de gros trigones et de 25-30 μ de diamètre. Amphigastre divisé au sommet, de 1,5 mm en tous sens. La partie foliaire reliant la feuille à l'amphigastre est denticulée.

Manuscrit déposé le 28 février 1974.

*Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris, 3^e sér., n° 269, nov.-déc. 1974,
Botanique 16 : 33-45.*

Achévé d'imprimer le 30 avril 1975.